



Hospital Traumatológico y Quirúrgico "Prof. Juan Bosch"
Km. 101, Autopista Duarte, Carretera Bonao-La Vega
El Pino, La Vega, Rep. Dom. • Tel. 809-725-8262 • Fax. 809-725-8452
"Año de la Consolidación y la Seguridad Alimentaria"

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL MEDICAMENTO:

Nifedipina de Retard de 30mg

Indicaciones terapéuticas:

Vasodilatador coronario antihipertensivo El principio activo, nifedipino, pertenece a una serie de medicamentos conocidos como calcioantagonistas. Los fármacos de este grupo dilatan las arterias coronarias, lo que aumenta el flujo sanguíneo y mejora el suministro de oxígeno al corazón. Por otro lado, el nifedipino dilata los vasos arteriales periféricos, lo que disminuye la presión arterial elevada. Nifedipino Retard está indicado para el tratamiento de la angina de pecho crónica estable (angina de esfuerzo) y de la hipertensión arterial.

PRESENTACION:

Cápsulas o Tabletas

Contraindicaciones

Si es alérgico (hipersensible) a nifedipino o a cualquiera de los demás componentes de Nifedipino Retard.-si está en tratamiento con rifampicina- si se encuentra en las primeras 20 semanas del embarazo o en periodo de lactancia No se le deberá administrar Nifedipino Retard si se encuentra en shock cardiovascular, en caso de angina inestable o si ha sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio.

Posología

— Niños: • Crisis hipertensivas: algunos autores no recomiendan la utilización de nifedipino en crisis hipertensivas debido al riesgo de la disminución brusca de la tensión arterial · Dosis inicial: 0,25-0,5 mg/kg/dosis. Puede repetirse si es necesario a las 4-6 h.