

Síntomas

- Un bulto o inflamación en la mama.
- Piel de la mama escamosa o enrojecida.
- Irritación o hundimientos en la piel de la mama.
- Secreción del pezón.
- Hundimiento del pezón o dolor en esa zona.

Diagnóstico

Esto dependerá de los síntomas y signos que pueda presentar la persona, siempre es bueno apoyarse con el autoexamen, de esta manera se detecta de forma temprana cualquier anomalía.

Tratamiento

El tratamiento implica cirugía para extraer el tejido mamario. Según tu situación particular, también es posible que te recomienden otros tratamientos, como la quimioterapia y la radioterapia.



arssenasa.gob.do

@ARSSeNaSaRD



Prevenir es vivir mejor



Centro de Atención al Usuario
Tels.: *737 | 809.333.3821 | 809.732.3821 | 809.701.3821
Desde el interior Tel.: 809.573.6272 (809 5 SeNaSa)



Prevención y control del Cáncer de Próstata

La próstata es un órgano que tienen solo los hombres. Situado debajo de la vejiga y delante del recto es del tamaño de una nuez. Produce un líquido que forma parte del semen.

El cáncer de próstata se produce más frecuentemente en la región posterior cerca del recto. Uno de cada 10 hombres puede desarrollarlo.

Factores de riesgo

- Mayor de 55 años.
- Historia familiar (hombres con antecedentes de algún familiar directo con Cáncer Prostático tienen 11 veces más probabilidad de padecerlo).
- Raza negra.
- Predisposición genética.

Síntomas

El cáncer de próstata suele ser totalmente asintomático en sus estados iniciales por lo cual es prudente su detección temprana.

Los síntomas más frecuentes son:

- Dificultad o dolor al orinar.
- Chorro de orina débil.
- Goteo luego de haber orinado.
- Sensación frecuente de orinar.
- Orinar frecuentemente (sin razón), especialmente por la noche.
- Sangre en la orina.
- Sangre en el semen.
- Dolor lumbar (espalda baja), cadera, muslos y/o testículos.
- Dolor al eyacular.
- Resultados elevados de una prueba en sangre del Antígeno Prostático Específico (PSA)

Diagnóstico

Mediante el tacto rectal realizado por el médico, se palpa la consistencia de la próstata. Junto al tacto se realiza también la prueba PSA.

Tratamiento

Suele depender de la etapa del cáncer, pero varían entre:

- Cirugía.
- Radioterapia.
- Terapia hormonal.
- Quimioterapia.

Recomendaciones y prevención

A partir de los 40 años, todo hombre debe realizarse el chequeo prostático completo. Consulte a su médico sobre los posibles riesgos y beneficios de las pruebas de detección.

Prevención y control del Cáncer de Mama en hombres

El cáncer de mama masculino es más común en los hombres mayores, aunque puede manifestarse a cualquier edad. 1 de cada 100 casos de cáncer de mama aparece en hombres.

Los hombres diagnosticados con cáncer de mama masculino en etapa temprana tienen una gran probabilidad de cura.

Factores de riesgo

- Edad avanzada. Ser mayor de 60 años.
- Exposición al estrógeno.
- Antecedentes familiares de cáncer de mama.
- Enfermedad del hígado.
- Obesidad.
- Enfermedad o cirugía testicular.